

## ŠPECIFICKÉ PRODUKTY APLIKÁCIA

Objekt na ošetrovanie	Roztok	Hĺbka aplikácia	Technika a vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi	Dávkovanie na jednotlivý bod alebo oblasť	Celková dávka	Frekvencia a počet sedení V závislosti od ošetrovania
<b>Ako difúzny enzým</b>	5 ml fyziol.roztoku 1 ml=300jednotiek	2-4 mm	Lineálne retrográdne ale ako „vejár“	25-75 jednotiek (v tomto prípade rozpustiť so želatínou aktívnou látkou)	150-600 U	V závislosti od ošetrovania. Lokálna anestéza, difúzia raz
<b>Celulitída (vláknitá/pórovitá)</b>	10ml fyziol.roztoku 1 ml=150 jednotiek	4-6 mm	Bod za bodom alebo lineárne retrográdne	750jednotiek rozmiestniť symetricky	1500 jednotiek	Maximálne 3 sedenia každých 30-45 dní
<b>Fibróza po liposúcii</b>	10 ml fyziol.roztoku 1 ml = 300 jednotiek	4-6 mm	Bod za bodom alebo lineárne retrográdne	od600do1500 jednotiek v závislosti na ošetrovanej ploche	1200-3000 jednotiek 150-600 jednotiek	Maximálne 3 sedenia každých 30-45 dní
<b>Deštrukcia výplne kyseliny hyalurónovej</b>	5 ml fyziol.roztoku 1 ml = 300 jednotiek	v závislosti na hĺbke do ktorej bol produkt aplikovaný	Bod za bodom alebo lineárne retrográdne	od 75 do 150 jednotiek v závislosti od objemu a problému, ktorý sa má ošetriť	150-600 jednotiek	Jedna aplikácia postačuje